

**ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  
ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  
6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024**

**ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ**

**ΘΕΜΑ Α**


Για τις προτάσεις **A1** έως και **A4** να γράψετε στο τέτραδίό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή επιλογή.

**A1.** Η υποστιβάδα 3d αποτελείται από

- α.** τρία (3) ατομικά τροχιακά.
- β.** πέντε (5) ατομικά τροχιακά.
- γ.** ένα (1) ατομικό τροχιακό.
- δ.** επτά (7) ατομικά τροχιακά.

**Μονάδες 5**

**A2.** Έχει αποκατασταθεί η παρακάτω χημική ισορροπία



Αυξάνοντας τον όγκο του δοχείου υπό σταθερή θερμοκρασία

- α.** δεν μετατοπίζεται η θέση της χημικής ισορροπίας.
- β.** μετατοπίζεται η θέση της χημικής ισορροπίας προς τα δεξιά.
- γ.** μετατοπίζεται η θέση της χημικής ισορροπίας προς τα αριστερά.
- δ.** αυξάνεται ο αριθμός mol του NO(g).

**Μονάδες 5**

**A3.** Η οργανική ένωση CH<sub>3</sub>COOH δεν αντιδρά με

- α.** αντιδραστήριο Fehling.
- β.** υδατικό διάλυμα K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>.
- γ.** μεταλλικό νάτριο Na.
- δ.** υδατικό διάλυμα NH<sub>3</sub>.

**Μονάδες 5**

**A4.** Η μεταβολή της ενθαλπίας μιας αντίδρασης εξαρτάται

- α.** μόνο από τη φύση των αντιδρώντων.
- β.** μόνο από τη φυσική κατάσταση των αντιδρώντων και των προϊόντων.
- γ.** μόνο από τις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας που λαμβάνει χώρα η αντίδραση.
- δ.** από όλα τα παραπάνω.


**Μονάδες 5**

- A5.** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **ΣΩΣΤΟ**, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
1. Το  $\psi^2$  εκφράζει την πιθανότητα να βρεθεί το ηλεκτρόνιο σε ένα ορισμένο σημείο του χώρου γύρω από τον πυρήνα.
  2. Η χημική ένωση  $\text{BeF}_2$  έχει ευθύγραμμη διάταξη. Δίνονται:  ${}_4\text{Be}$ ,  ${}_9\text{F}$ .
  3. Στην κατάσταση χημικής ισορροπίας οι ταχύτητες των δύο αντιδράσεων που εκφράζουν οι δύο αντίθετες κατευθύνσεις έχουν μηδενιστεί.
  4. Η πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωσης είναι πάντοτε θετική.
  5. Τα κατώτερα μέλη των αλκοολών διαλύονται εύκολα στο νερό.

**Μονάδες 5**

## ΘΕΜΑ Β

- B1.** Δίνονται τα στοιχεία X, Ψ με ατομικούς αριθμούς 18 και 19, αντίστοιχα.
- a. Να βρείτε την ηλεκτρονιακή δομή σε υποτιθέμενες των δύο στοιχείων στη θεμελιώδη τους κατάσταση.
- (Μονάδες 2)
- b. Να προσδιορίσετε σε ποιον τομέα, σε ποια περίοδο και σε ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα βρίσκεται κάθε ένα από τα δύο στοιχεία.
- (Μονάδες 3)
- γ. Στο παρακάτω σχήμα αποτυπώνεται η ενέργεια πρώτου ιοντισμού ( $E_{i1}$ ) τεσσάρων διαδοχικών χημικών στοιχείων σε συνάρτηση με τον ατομικό τους αριθμό ( $Z$ ).




Οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Σ1, Σ2, Σ3, Σ4 μπορεί να είναι, αντίστοιχα:

- i) 17, 18, 19, 20
- ii) 16, 17, 18, 19
- iii) 18, 19, 20, 21

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (μονάδα 1). Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας (μονάδες 2).

**Μονάδες 8**

- B2.** Μπλε χρώματος στερεό  $\text{CoCl}_2(s)$  μεταβάλλει το χρώμα του σε ροδόχρουν στερεό  $\text{CoCl}_2(s) \cdot 6\text{H}_2\text{O}(s)$  σύμφωνα με την αμφίδρομη χημική εξίσωση:



- a. Βασιζόμενοι στην παραπάνω ισορροπία, εξηγήστε γιατί το μπλε  $\text{CoCl}_2(s)$  χρησιμοποιείται για την ανίχνευση της υγρασίας.

(Μονάδες 3)

- b. Με αύξηση της θερμοκρασίας το χρώμα του στερεού γίνεται μπλε. Να εξηγήσετε αν η αντίδραση προς τα δεξιά είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη.

(Μονάδες 3)

**Μονάδες 6**

- B3.** Δίνεται ο πίνακας:

| Ένωση | Σημείο Βρασμού |
|-------|----------------|
| LiH   | 1270 °C        |
| HF    | 23 °C          |
| HBr   | -66 °C         |
| HCl   | -82 °C         |

- a. Να εξηγήσετε την πόλυ μεγάλη τιμή του σημείου βρασμού του LiH.

(Μονάδες 2)

- b. Να εξηγήσετε γιατί το HF έχει μεγαλύτερο σημείο βρασμού από τα άλλα υδραλογόνα.

(Μονάδες 2)

- γ. Να εξηγήσετε γιατί το HBr έχει μεγαλύτερο σημείο βρασμού από το HCl.


(Μονάδες 2)

Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες:  $\text{Ar}(\text{H}) = 1$ ,  $\text{Ar}(\text{Cl}) = 35,5$  και  $\text{Ar}(\text{Br}) = 80$ .

Δίνονται οι ατομικοί αριθμοί:  ${}_3\text{Li}$ ,  ${}_1\text{H}$ .

**Μονάδες 6**

- B4.** Στο παρακάτω σχήμα, δίνεται η ενεργειακή κατανομή μορίων σε δύο διαφορετικές θερμοκρασίες  $T_1$  και  $T_2$ .




Ποια από τις θερμοκρασίες  $T_1$  ή  $T_2$  είναι υψηλότερη (μονάδα 1); Αιτιολογήστε την απάντησή σας (μονάδες 4).

**Μονάδες 5**

### ΘΕΜΑ Γ

- Γ1.** Δίνονται οι παρακάτω αντιδράσεις:



- a. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων  $\textcircled{A}$ ,  $\textcircled{B}$ ,  $\textcircled{\Gamma}$ ,  $\textcircled{\Delta}$ ,  $\textcircled{E}$ ,  $\textcircled{Z}$ ,  $\textcircled{\Theta}$ ,  $\textcircled{K}$ ,  $\textcircled{\Lambda}$ ,  $\textcircled{M}$ .

(Μονάδες 10)

- β.** Εξηγήστε τη χρήση απόλυτου αιθέρα για τον σχηματισμό της ένωσης Δ, γράφοντας την αντίστοιχη χημική εξίσωση.

(Μονάδα 1)  
**Μονάδες 11**

- Γ2.** Ποσότητα 1 mol προπενίου πολυμερίζεται πλήρως υπό κατάλληλες συνθήκες και προκύπτει διάλυμα όγκου 1 L. Το διάλυμα μετά τον πολυμερισμό έχει ωσμωτική πίεση 0,0246 atm σε θερμοκρασία  $\theta = 27^\circ\text{C}$ .
- α.** Να γράψετε τη χημική εξίσωση πολυμερισμού.

(Μονάδα 1)

- β.** Να προσδιορίσετε τον αριθμό των μορίων του μονομερούς που σχηματίζουν ένα μόριο πολυμερούς.


(Μονάδες 3)

- γ.** Να αναφέρετε το είδος των υβριδικών τροχιακών όλων των ατόμων στο μονομερές και στην επαναλαμβανόμενη δομική μονάδα του πολυμερούς (μονάδα 1). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μονάδα 1).

$$\text{Δίνεται: } R = 0,082 \frac{\text{L} \cdot \text{atm}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

**Μονάδες 6**

- Γ3.** Σε κενό δοχείο όγκου 2 L και σε θερμοκρασία  $\theta^\circ\text{C}$ , προστίθεται ποσότητα στερεής οργανικής ένωσης X και 0,6 mol ένωσης Ψ, οπότε πραγματοποιείται η απλή αντίδραση με χημική εξίσωση:



Τη χρονική στιγμή  $t_1$  η ποσότητα του  $\Omega$  στο δοχείο είναι 0,1 mol. Τη χρονική στιγμή  $t_2$  ολοκληρώνεται η χημική αντίδραση και το σύνολο των αερίων μορίων είναι 0,4 mol.

- α.** Να υπολογίσετε τη στιγμαία ταχύτητα της αντίδρασης τη χρονική στιγμή

(Μονάδες 2)

- β.** Να υπολογίσετε τη στιγμαία ταχύτητα κατανάλωσης του  $\Psi$  τη χρονική στιγμή  $t_1$ .

(Μονάδες 2)

- γ.** Να υπολογίσετε τη σύσταση όλων των σωμάτων τη χρονική στιγμή  $t_2$ .

(Μονάδες 4)

**Μονάδες 8**

Δίνεται η σταθερά ταχύτητας,  $k = 10^{-3} M^{-1} \cdot s^{-1}$ .

## Μονάδες 5

### ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Υδατικό διάλυμα, που περιέχει  $\text{CH}_3\text{COOH}$  συγκέντρωσης 1 M και  $\text{HCOOH}$  συγκέντρωσης 0,8 M, βρίσκεται σε θερμοκρασία 25°C. Να υπολογιστεί η συγκέντρωση των  $\text{H}_3\text{O}^+$  στο διάλυμα.

Δίνονται:

- Για το  $\text{CH}_3\text{COOH}$ :  $K_a = 10^{-5}$
- Για το  $\text{HCOOH}$ :  $K'_a = 10^{-4}$
- Τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις.

Δ2. Διαθέτουμε τα παρακάτω διαλύματα:

- Y1: Υδατικό διάλυμα  $\text{NH}_3$  όγκου 100 mL και συγκέντρωσης 0,5 M
  - Y2: Υδατικό διάλυμα  $\text{HBr}$  όγκου 100 mL και συγκέντρωσης 1 M
- α. Να υπολογιστεί ο μέγιστος όγκος ρυθμιστικού διαλύματος Y3 με  $\text{pH} = 9$ , που μπορεί να προκύψει από την ανάμιξη των διαλυμάτων Y1 και Y2.

(Μονάδες 7)

Δίνονται:

- $K_w = 10^{-14}$
- Για την  $\text{NH}_3$ :  $K_b = 10^{-5}$
- Όλα τα διαλύματα βρίσκονται σε θερμοκρασία  $\theta = 25^\circ\text{C}$  και τα δεδομένα του προβλήματος επιτρέπουν τις γνωστές προσεγγίσεις.

β. Στο ρυθμιστικό διάλυμα Y3 με  $\text{pH} = 9$  προσθέτουμε σταγόνες του δείκτη ΗΔ με  $K_{\text{a}_{\text{ΗΔ}}} = 10^{-9}$ . Να υπολογιστεί ο βαθμός ιοντισμού του δείκτη ΗΔ στο διάλυμα Y3. Η θερμοκρασία του διαλύματος παραμένει σταθερή.

(Μονάδες 4)

## Μονάδες 11

Δ3. 10 gr δείγματος  $\text{S}(s)$  καίγονται πλήρως και σχηματίζεται  $\text{SO}_2(g)$ . Η ποσότητα του  $\text{SO}_2(g)$  διαβιβάζεται σε υδατικό διάλυμα χλωρίου ( $\text{Cl}_2$ ) και αντιδρά πλήρως σύμφωνα με τη χημική εξίσωση (1):



Τα οξέα που σχηματίζονται εξουδετερώνονται πλήρως από διάλυμα  $\text{NaOH}$  συγκέντρωσης 0,5 M και όγκου 2 L.

α. Να ισοσταθμίσετε τη χημική εξίσωση (1).

(Μονάδες 2)

- β.** Να προσδιορίσετε την % w/w περιεκτικότητα του δείγματος σε S(s).  
(Μονάδες 5)
- γ.** Να αιτιολογήσετε, χωρίς υπολογισμούς, γράφοντας τις κατάλληλες αντιδράσεις, αν το τελικό διάλυμα που προκύπτει μετά την εξουδετέρωση είναι όξινο, βασικό ή ουδέτερο.  
(Μονάδες 2)

Δίνεται η σχετική ατομική μάζα: Ar(S) = 32.

Θεωρούμε ότι οι προσμίξεις του δείγματος είναι αδρανείς.

**Μονάδες 9**

ΕΝΑ  
&

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ  
ΒΕΡΟΙΑΣ